

Identificación **Fecha**

El presente índice es utilizable en pacientes deprimidos ya diagnosticados. Marque en cada ítem la variable que corresponda al enfermo.

En el ítem 2 cuando se supere la cifra de 100 semanas, anote sólo 100.

En el ítem 3 cuando se supere la cifra de 100 visitas, anote sólo 100.

1.- SEXO

- Hombre
- Mujer

2.- NÚMERO DE SEMANAS QUE DURA LA FASE ACTUAL:

3.- NÚMERO DE VECES QUE HA VISITADO AL PSIQUIATRA A LO LARGO DE LA DURACIÓN DE LA FASE ACTUAL:

4.- TENTATIVAS SUICIDAS PREVIAS DEL

- No ha tenido
- Una tentativa manipuladora, no seria
- Tres o más tentativas manipuladoras o una seria
- Dos o más tentativas serias en el pasado

5.- IDEAS SUICIDAS ACTUALES (en el último mes)

- No ha tenido o tiene miedo a suicidarse sin desearlo
- La vida le parece que no es digna de ser vivida
- Piensa que lo mejor sería estar muerto
- Ha pensado quitarse la vida

Por tentativa suicida seria se entiende aquella en la que se han utilizado medios suficientes (psicofármacos, analgésicos a dosis altas, gas, ahorcamiento, etc) y la preparación asegura la eficacia del intento (se encierra, espera a estar sólo, selecciona un lugar poco frecuentado, etc.)

Por tentativa manipuladora se entiende aquella que contó con medios insuficientes (vitaminas, cortes superficiales, psicofármacos a dosis bajas) o suficientes, pero la preparación permite ser encontrado a tiempo o que los demás se den cuenta de lo que está haciendo.

LOG ODDS:

RIESGO SUICIDA (RSD):